

খাবারে অ্যালার্জি জিরুরি পরচিহ্নার পরকিল্পনা শিশুদের জন্য (বয়স ৩ এবং তার বেশি)

নাম _____	জন্মতারিখ _____
অ্যালার্জি রিফ্রেস _____	অযাজমা _____
শিশুটি নজিরে এপনিফেরনি প্রয়োগ করতে প্রস্তুতি এবং সক্ষম _____	হ্যাঁ (গভীর প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি বেশি) না _____
যোগাযোগের নাম _____	হ্যাঁ (সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে) না _____
অ্যালার্জি বিশেষজ্ঞ/ডাক্তারের নাম _____	যোগাযোগের ফোন নম্বর _____
অ্যালার্জি বিশেষজ্ঞ/ডাক্তারের স্বাক্ষর _____	অ্যালার্জি বিশেষজ্ঞ/ডাক্তারের ফোন নম্বর _____
	তারিখ _____

যদি আপনার শিশুর হালকা উপসর্গ দেখা যায়:

চামড়া: কয়েকটি চুলকানি ফুসকুড়ি, হালকা চুলকানি, ঠোঁটে ফোলাভাব
নাক: চুলকানি, জল পড়া, হাঁচি
পাকস্থলী: হালকা বমিভাব, অস্বস্তি, একবার বমি

এই কাজগুলো
করুন


- শিশুর সঙ্গের সাথে থাকা এবং অ্যান্টিহিস্টামিন দিন।
- যদি দুই বা ততোধিক হালকা উপসর্গ দেখা যায় বা উপসর্গ বাড়তে থাকে, এপনিফেরনি দিন এবং নজিরে নজরদারি অনুসরণ করুন।

যদি আপনার শিশুর গুরুতর উপসর্গ দেখা যায়:

ফুসফুস: শ্বাসকষ্ট, হাঁপ ধরা, কাশি
মুখ: জিহ্বা দৃশ্যমান ফোলাভাব
গলা: টান, কন্ঠকণ্ঠ, গলিতে সমস্যা
চামড়া: সারা শরীরে অনেকে ফুসকুড়ি, ছড়িয়ে পড়া লাল/বগুন/ছাই রঙ

হৃদয়: অজ্ঞান হওয়া, দুর্বল নাড়ি, মাথা ঘোরা, ফ্যাকাশে, নীল/ছাই রঙের ত্বক, ঠোঁট, নখ
পাকস্থলী: একটানা বমি বা ডায়রিয়া
অন্যান্য: খারাপ কিছু ঘটতে চলছে এমন অনুভূতি, বিভ্রান্ত/উত্তেজিত

- অবলম্বে এপনিফেরনি দিন এবং কখন এটি দেওয়া হয়েছে তা লিখে রাখুন। শিশুর পাশে থাকুন।
- পরবর্তী ধাপ: দেখে অপেক্ষা করবেন না ৭১১/জরুরি স্বাস্থ্যসেবা ডাকবেন, স্টেটিসিদ্ধান্ত নিন:
যেকোনো সময়, যেকোনো উপসর্গের ক্ষেত্রে, যদি আপনার নিশ্চিতি না হন বা ডাক্তার পূর্বে আপনাকে বলেছেন, তাহলে ৭১১/জরুরি স্বাস্থ্যসেবা ডাকুন এপনিফেরনি ব্যবহারের পর।



- হৃদয়জনিত উপসর্গ থাকলে বা দুই ডোজ এপনিফেরনি দেওয়া হলে শিশুকে পিঠে শুইয়ে রাখুন এবং পা উঁচু করুন। শ্বাস নতিকে কষ্ট হলে বা বমিকরলে, পাশে বসানো বা কাত করে শোয়ানো যত্নে পারো।
- শিশুর অযাজমা থাকলে দ্রুত-প্রতিক্রিয়ার ইনহেলার দিন (নজিরে দেখুন)।
- অ্যান্টিহিস্টামিন দিন (নজিরে দেখুন)।

ঔষধসমূহ:

Epinephrine Auto-injector:

0.15 mg 0.3 mg
(উন্নত বাইরের অংশে ইনজেকশন দিন)

Epinephrine Nasal Spray:

1 mg 2 mg
(১ স্প্রের নাকের ভেতর)

Asthma Quick Relief/Rescue Inhaler:

Albuterol	_____	পাফ
Albuterol/Budesonide	_____	পাফ
Salbutamol	_____	পাফ
Budesonide/Formoterol	_____	পাফ
Mometasone/Formoterol	_____	পাফ

Antihistamine*:

Cetirizine	_____	mg
Diphenhydramine	_____	mg


অন্যান্য: _____
*গুরুতর উপসর্গের ক্ষেত্রে প্রথমত এপনিফেরনি ব্যবহার করুন

এপনিফেরনি কীভাবে ব্যবহার করবেন অযানাফাইল্যাক্সসি (গুরুতর অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়া) চিকিৎসায়

প্রতিটি যন্ত্রে একটি মাত্র ডোজ থাকে। দ্বিতীয় ডোজে প্রয়োজন হলে, নতুন যন্ত্র ব্যবহার করুন।


AUVI-Q™ (Epinephrine Injection, USP) ব্যবহারের নির্দেশনা

1. AUVI-Q বাইরের কসে থেকে টানুন — এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভাঙবে।
2. লাল সফট গার্ড (লেবেল "A") খুলে ফেলুন।
3. কালো প্রান্ত (লেবেল "B") উরুর মাঝামাঝি বাইরের দিকে দিন।
4. শক্ত করে চেপে ধরুন এবং ২ সেকেন্ড ধরে রাখুন।




Generic Adrenaclick® Auto-Injector ব্যবহারের নির্দেশনা

1. বাইরের কসে খুলুন।
2. "1" ও "2" লেখা ধূসর ক্যাপ খুলুন।
3. "3" লেখা লাল প্রান্ত উরুর মাঝামাঝি বাইরের দিকে রাখুন।
4. জোরে চেপে ধরুন যতক্ষণ না সূঁচ ঢুকতে যায়।
5. ১০ সেকেন্ড ধরে রাখুন, তারপর সরিয়ে ফেলুন।



EpiPen® বা Generic Auto-Injector ব্যবহারের নির্দেশনা

1. স্বচ্ছ ক্যারিয়ার টিউব থেকে EpiPen বের করুন।
2. "C" লেবেলযুক্ত নীল নরিপাত্তা রলিজি সোজা টানুন।
3. "D" লেবেলযুক্ত কমলা প্রান্ত উরুর মাঝামাঝি বাইরের দিকে জোরে ঠেলো দিন যতক্ষণ না «ক্লিক» শব্দ শোনা যায়।
4. ৩ সেকেন্ড ধরে রাখুন (ধীরে গুনুন: ১, ২, ৩)।



Neffy® Epinephrine Nasal Spray ব্যবহারের নির্দেশনা

1. প্যাকেটে থেকে neffy বের করুন। যন্ত্রটি পরীক্ষা করবেন না।
2. বুড়ো আঙুল পস্টিনের নচি ও অন্য দুটি আঙুল মুখের প্রান্তের দুই পাশে রাখুন।
3. মুখের প্রান্ত নাকের ভেতর ঢোকান যতক্ষণ না আঙুল নাক ছোঁয়।
4. পস্টিন জোরে চেপে ধরুন যতক্ষণ না এটি ক্লিক করে ও তরল স্প্রে হয়।
5. দ্বিতীয় ডোজ দরকার হলে, একই নাসারন্ধ্রে আবার স্প্রে করুন।

