

খাবারে অ্যালার্জি জিরুরি পরচিহ্নের পরকল্পনা শিশুদের জন্য (বয়স ৩-এর নিচে)

নাম _____	জন্মতারিখ _____
অ্যালার্জি রিষছে _____	অযাজমা _____ হ্যাঁ (গভীর প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি বিশেষ) না _____
যোগাযোগের নাম _____	যোগাযোগের ফোন নম্বর _____
অ্যালার্জি বিশেষজ্ঞ/ডাক্তারের নাম _____	অ্যালার্জি বিশেষজ্ঞ/ডাক্তারের ফোন নম্বর _____
অ্যালার্জি বিশেষজ্ঞ/ডাক্তারের স্বাক্ষর _____	তারিখ _____

যদি আপনার শিশুর হালকা উপসর্গ দেখা যায়:

চামড়া: কয়েকটি চুলকানি ফুসকুড়ি, হালকা চুলকানি, ঠোঁটে ফোলাভাব
নাক: চুলকানি, জল পড়া, হাঁচি
পাকস্থলী: হালকা বমিভাব, অস্বস্তি, একবার বমি

এই কাজগুলো
করুন

- শিশুর সঙ্গে থাকুন এবং অ্যান্টিহিস্টামিন দিন।
- যদি দুই বা ততোধিক হালকা উপসর্গ দেখা যায় বা উপসর্গ বাড়তে থাকে, এপনিফেরিন দিন এবং নচিরে নর্দিশেনা অনুসরণ করুন।

যদি আপনার শিশুর গুরুতর উপসর্গ দেখা যায়:

ফুসফুস: শ্বাসকষ্ট, হাঁপ ধরা, কাশি, খুঁকখুঁক কাশি, নাক ফুলে ওঠা
(নাসারন্ধ্র পরশসূত হওয়া)

চামড়া: সারা শরীরে অনেকে ফুসকুড়ি, ছড়িয়ে থাকা লাল/বগুন/ছাই রঙ, অসম রঙ বা প্যাচযুক্ত/জালরে মতো চেহারা

হৃদয়: অজ্ঞান হওয়া, দুর্বল নাড়ি, মাথা ঘোরা, ফ্যাকাশে, জাগানো কঠনি, ঢলি, নীল/ছাই রঙের ত্বক, ঠোঁট, নখ, পা

চোখ ও কান: চোখে ঘষাঘষি, কান টানা বা আঙুল ঢোকানো

মুখ: জিভে দৃশ্যমান ফোলাভাব, জিভ টানা বা ঠলো, লাল পড়া

গলা: টান, করকশ কণ্ঠ, গলিতে সমস্যা, জোরে জোরে শ্বাস নেওয়া, গলা টান


পাকস্থলী: একটানা বমি বা ডায়রিয়া

আচরণ: অল্পতেই বিরক্ত হওয়া, শান্ত না হওয়া কান্না, শান্ত/অ্যাকটিভি কম হওয়া, নজিকে গুটিয়ে ফেলা বা আঁকড়ে ধরা

1. অবলম্বে এপনিফেরিন দিন এবং কখন এটি দেওয়া হয়েছে তা লিখে রাখুন। শিশুর পাশে থাকুন।

2. পরবর্তী ধাপ: দেখে অপেক্ষা করবেন নাকি 911/জরুরি স্বাস্থ্যসেবা ডাকবেন, স্টেসিদিধানত ননি:

যেকোনো সময়, যেকোনো উপসর্গের ক্ষেত্রে, যদি আপনার নিশ্চিতি না হন বা ডাক্তার পূর্বে আপনাকে বলছেন, তাহলে 911/জরুরি স্বাস্থ্যসেবা ডাকুন এপনিফেরিন ব্যবহারের পর।



3. হৃদয়জনিত উপসর্গ থাকলে বা দুই ডোজ এপনিফেরিন দেওয়া হলে শিশুকে পিঠে শুইয়ে রাখুন এবং পা উঁচু করুন। শ্বাস নতি কষ্ট হলে বা বমি করলে, পাশে বসানো বা কাত করে শোয়ানো যত্নে পারবে।

4. শিশুর অযাজমা থাকলে দ্রুত-প্রতিক্রিয়ার ইনহেলার দিন (নচি দেখুন)।

5. অ্যান্টিহিস্টামিন দিন (নচি দেখুন)।

ঔষধসমূহ:

Epinephrine Auto-injector:

0.1 mg 0.15 mg

(উরুর বাইরের অংশে ইনজেকশন দিন)

Epinephrine Nasal Spray:

1 mg

(১ স্প্রের নাকের ভেতর)

Asthma Quick Relief/Rescue Inhaler:

Albuterol _____ প্যাফ

Albuterol/Budesonide _____ প্যাফ

Salbutamol _____ প্যাফ

Budesonide/Formoterol _____ প্যাফ

Mometasone/Formoterol _____ প্যাফ

Antihistamine*:

Cetirizine _____ mg

Diphenhydramine _____ mg

অন্যান্য: _____


*গুরুতর উপসর্গের ক্ষেত্রে প্রথমত এপনিফেরিন ব্যবহার করুন

এপনিফেরনি কীভাবে ব্যবহার করবেন অযানাফাইল্যাক্সসি (গুরুতর অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়া) চিকিৎসায়

প্রতিটি যন্ত্রে একটিমাত্র ডোজ থাকে। দ্বিতীয় ডোজে প্রয়োজন হলে, নতুন যন্ত্র ব্যবহার করুন।
যদি আপনাকে শিশু বা নবজাতককে এপনিফেরনি ইনজেকশন দেন, তাদের পা শক্তভাবে ধরে রাখুন
ইনজেকশন দেওয়ার সময়।


AUVI-Q™ (Epinephrine Injection, USP) ব্যবহারের নির্দেশনা

1. AUVI-Q বাইরের কসে থেকে টানুন — এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভয়সে নির্দেশনা চালু করবে।
2. লাল সফেটিগার্ড (লেবেল "A") খুলে ফেলুন।
3. কালো প্রান্ত (লেবেল "B") উরুর মাঝামাঝি বাইরের দিকে দিন।
4. শক্ত করে চেপে ধরুন এবং ২ সেকেন্ড ধরে রাখুন।




Generic Adrenaclick® Auto-Injector ব্যবহারের নির্দেশনা

1. বাইরের কসে খুলুন।
2. "1" ও "2" লেখা ধূসর ক্যাপ খুলুন।
3. "3" লেখা লাল প্রান্ত উরুর মাঝামাঝি বাইরের দিকে রাখুন।
4. জোরে চেপে ধরুন যতক্ষণ না সূঁচ ঢুক যায়।
5. ১০ সেকেন্ড ধরে রাখুন, তারপর সরিয়ে ফেলুন।



EpiPen® বা Generic Auto-Injector ব্যবহারের নির্দেশনা

1. স্বচ্ছ ক্যারিয়ার টিউব থেকে EpiPen বের করুন।
2. "C" লেবেলযুক্ত নীল নরিপাত্তা রলিজি সোজা টানুন।
3. "D" লেবেলযুক্ত কমলা প্রান্ত উরুর মাঝামাঝি বাইরের দিকে জোরে ঠেলো দিন যতক্ষণ না «ক্লিক» শব্দ শোনা যায়।
4. ৩ সেকেন্ড ধরে রাখুন (ধীরে গুনুন: ১, ২, ৩)।



Neffy® Epinephrine Nasal Spray ব্যবহারের নির্দেশনা

1. প্যাকেট থেকে neffy বের করুন। যন্ত্রটি পরীক্ষা করবেন না।
2. বুড়ো আঙুল পিস্টনের নচি ও অন্য দুটি আঙুল মুখোল প্রান্তের দুই পাশে রাখুন।
3. মুখোল প্রান্ত নাকের ভেতর ঢোকান যতক্ষণ না আঙুল নাক ছোঁয়।
4. পিস্টন জোরে চেপে ধরুন যতক্ষণ না এটিক্লিক করে ও তরল স্প্রে হয়।
5. দ্বিতীয় ডোজ দরকার হলে, একই নাসারন্ধ্রে আবার স্প্রে করুন।

